

SteatoScreen

Ф.И.О. : :


Демографические данные

Пол _____
Дата рождения _____

Анализы

Дата сдачи анализов	11/03/2010
Основные клинические данные	Неизвестно
Альфа2 Макроглобулин (г/л)	3.20
Гаптоглобин (г/л)	1.47
Аполипопротеин А1 (г/л)	1.24
Билирубин (мкмоль/л)	17.20
Гамма ГТ (МЕ/л)	21
АЛТ (МЕ/л)	39
АСТ (МЕ/л)	30
Уровень глюкозы натощак (ммоль/л)	4.76
Триглицериды (ммоль/л)	0.43
Общий холестерин (ммоль/л)	3.93
Вес (кг)	100.00
Рост (м)	1.87

SteatoScreen



Уровень : 3

Интерпретация

Уровень SteatoScreen: 3

- Подозрение на выраженный фиброз, выраженный стеатоз печени отсутствует.

- Настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом по заболеваниям печени и сделать соответствующий диагностический тест (FibroTest) для определения стадии фиброза.

Меры предосторожности по использованию

- Соблюдение рекомендуемых Биопредиктивом условий до и во время проведения анализа является основой получения достоверных результатов.
- Тест не применяется при: остром гемолизе, остром гепатите, острых воспалительных заболеваниях, внепеченочном холестазах.
- Посоветуйтесь со специалистом при интерпретации теста в случае хронического гемолиза или синдрома Жильбера.
- Результаты теста не подтверждаются у пациентов с трансплантированной печенью.
- Будьте внимательны при интерпретации результатов в случае крайних значений какого-либо из показателей.
- При несоответствии результатов биопсии и теста обсудите ситуацию со специалистом. Причиной могут быть ошибочные результаты как теста, так и биопсии: например, ошибка биопсии в определении стадии фиброза отмечается в 33% случаев.
- ФиброТест и СтеатоТест используются при хронических гепатитах В и С, алкогольном и неалкогольном стеатозе.
- НэшТест проводится при неалкогольном стеатогепатите.
- ЭшТест проводится при алкогольном стеатогепатите.
- АктиТест проводится при хронических гепатитах В и С.